

'Low Risk Prostate Cancer and Active Surveillance'

1. Het risico op het ontwikkelen van (agressieve) prostaatkanker en op sterfte aan prostaatkanker bij mannen in een screening populatie met initiële PSA waardes <3.0 ng/ml is positief gerelateerd aan de absolute hoogte van de initiële PSA waarde. *(dit proefschrift)*
2. Een afwachtend beleid bij mannen met laag- tot matig-risico prostaatkanker geeft gunstige ziekte-specifieke uitkomsten na 7.4 jaar follow-up. *(dit proefschrift)*
3. Reclassificatie van risico op de korte termijn is de belangrijkste reden voor mannen die een active surveillance beleid volgen om alsnog uitgestelde behandeling te ondergaan. *(dit proefschrift)*
4. Klinische karakteristieken bij diagnose en tijdens follow-up van mannen die een active surveillance beleid volgen hebben een voorspellende waarde voor het optreden van reclassificatie van de ziekte naar een hoger risico. *(dit proefschrift)*
5. Active surveillance voor laag-risico prostaatkanker draagt bij aan het verminderen van overbehandeling van prostaatkanker. *(dit proefschrift)*
6. Ouderdom leidt uiteindelijk altijd tot overlijden, prostaatkanker slechts in sommige gevallen.
7. Het zijn niet de patiënten, maar de zorgverzekeraars die het meeste baat hebben bij marktwerking in de zorg.
8. Een doctoraat zegt niks over de handvaardigheid van een snijdend specialist.
9. Onderzoek doen is het vinden van vragen bij het zoeken naar antwoorden.
10. De opkomst van 'social media' hebben geleid tot een devaluatie van het begrip 'vriend'.
11. All that is needed to achieve your goals is the desire to succeed.